



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 46

(XV, I, II REGIONES)

(11 al 17 noviembre 2013)

Convenio I: Asesoría Integral para la Pesca y Acuicultura, 2013

Proyecto 1.10. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / Noviembre 2013

REQUIRENTE
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretario de Economía
Tomás Flores Jaña

EJECUTOR
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación Pesquera
Jorge Castillo Pizarro

Director Ejecutivo
José Luis Blanco García

JEFA PROYECTO
M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR
Eduardo Díaz Ramos



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento microscópico de la evolución de la actividad de desove semanal de este recurso, monitoreo que se realiza a través del análisis histológico de muestras de ovarios de ejemplares provenientes de diferentes zonas de pesca. En la semana 23 (3 al 9 junio, 2013) se dio inicio al monitoreo reproductivo de la anchoveta entre la XV y II Región.

Se entregan resultados de 150 hembras muestreadas en la semana 46 (11 al 17 noviembre, 2013) provenientes de la Zona de Arica (5 millas frente al puerto de Arica y 33 millas de Punta Madrid), de la Zona de Iquique (42 millas de Punta Colorada) y de la Zona de Antofagasta (4 millas de Punta Yayas).

La distribución de fases microscópicas mostró el predominio de ovarios en desarrollo avanzado (EMS 4 y 5), con un aporte alto de hembras con evidencia de desove (EMS 6 a 8). Un 1% se presentó en regresión (EMS 9) (término del desove). No se observaron hembras en regeneración (EMS 2) y en vitelación inicial (EMS 3). Los resultados mostraron hembras en desarrollo reproductivo, con incidencia de desove (Tabla 1).

Tabla 1

Incidencia de fases microscópicas de madurez de ovarios de anchoveta. Zona Arica-Antofagasta, semana 46.

	Fases ováricas microscópicas									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
n	0	0	0	38	38	0	0	73	1	150
%	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3	0,0	0,0	48,7	0,7	

Las fases agrupadas indicadoras de actividad (EMS 3 a 8) señaló 99% de las hembras con actividad reproductiva, de las cuales, 51% se presentó en desarrollo gonadal y 49% en desove (Tabla 2 y Figura 1).



Tabla 2
Análisis histológico de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 46.

Semana (N°)	Fecha 2013	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta					Número	
		Hidratadas	FPO día 0	FPO día 1	FPO día 2	Desarrollo	Activas	Total
23	03/06 - 09/06	0,0	0,0	13,9	13,9	72,3	101	102
24	10/06 - 16/06	4,8	0,0	14,3	6,8	74,1	147	150
25	17/06 - 23/06	0,0	0,0	33,3	25,2	41,5	147	150
26	24/06 - 30/06	0,0	0,0	23,4	6,5	70,1	107	107
27	01/07 - 07/07	0,0	0,0	22,2	22,2	55,7	158	158
28	08/07 - 14/07	0,6	0,6	19,0	15,8	63,9	100	158
29	15/07 - 21/07	6,7	0,0	21,2	15,0	57,0	193	195
30	22/07 - 28/07	8,6	0,0	12,6	7,1	71,7	198	198
31	29/07 - 04/08	11,2	0,0	16,2	3,6	69,0	197	202
32	05/08 - 11/08							
33	12/08 - 18/08	13,4	0,0	15,8	10,3	60,5	253	254
34	19/08 - 25/08							
35	26/08 - 01/09	9,8	0,0	19,2	7,3	63,6	286	289
36	02/09 - 08/09							
37	09/09 - 15/09							
38	16/09 - 22/09							
39	23/09 - 29/09	4,6	0,0	40,3	7,1	48,0	196	197
40	30/09 - 06/10	0,0	0,0	39,5	7,0	53,5	215	215
41	07/10 - 13/10	1,5	0,0	31,3	4,5	62,6	198	199
42	14/10 - 20/10	1,5	0,0	25,1	3,1	70,3	195	196
43	21/10 - 27/10	0,0	0,0	27,2	6,2	66,7	195	196
44	28/10 - 03/11	0,0	0,0	39,7	9,3	51,0	151	152
45	04/11 - 10/11	0,0	0,0	24,2	3,8	72,0	132	147
46	11/11 - 17/11	0,0	0,0	22,8	26,2	51,0	149	150




Figura 1 Incidencia semanal de hembras activas (fases agrupadas 3 a 8), año 2011-2013.

En la Zona Norte, el índice de actividad de desove (IAD) en la semana 46 fue 23%, con 0,7% de atresia ovocitaria (Tabla 3). De acuerdo al comportamiento histórico del IAD, los desoves se intensifican en las semanas de julio con registros que se mantienen en valores relativamente altos hasta mediados de octubre (IAD: $\geq 25\%$) (Figura 2).



Tabla 3
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 46.

Semana (N°)	Fecha 2013	Macroscópico		Microscópico		
		IGS	n	IAD	IAO	n
23	03/06 - 09/06	6,2	75	13,7	0,0	102
24	10/06 - 16/06	5,6	136	18,7	0,0	150
25	17/06 - 23/06	5,6	120	32,7	0,0	150
26	24/06 - 30/06	7,2	107	23,4	0,0	107
27	01/07 - 07/07	6,6	243	22,2	0,0	158
28	08/07 - 14/07	6,1	232	20,3	0,0	158
29	15/07 - 21/07	6,5	204	27,7	1,0	195
30	22/07 - 28/07	9,2	135	21,2	0,0	198
31	29/07 - 04/08	8,1	380	26,7	2,5	202
32	05/08 - 11/08					
33	12/08 - 18/08			29,1	0,4	254
34	19/08 - 25/08					
35	26/08 - 01/09	7,8	342	28,7	0,7	289
36	02/09 - 08/09					
37	09/09 - 15/09					
38	16/09 - 22/09					
39	23/09 - 29/09	7,5	318	44,7	0,5	197
40	30/09 - 06/10	6,6	232	39,5	0,0	215
41	07/10 - 13/10	6,9	275	32,7	0,5	199
42	14/10 - 20/10	6,5	370	26,5	0,5	196
43	21/10 - 27/10	6,4	440	27,0	0,5	196
44	28/10 - 03/11	6,0	186	39,5	0,7	152
45	04/11 - 10/11	6,1	516	21,8	10,2	147
46	11/11 - 17/11			22,7	0,7	150




Figura 2 Comportamiento semanal del IAD e IAO en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013. (La línea representa el umbral de IAD de 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).



De acuerdo al comportamiento del 3ndice gonadosom3tico (IGS) la anchoveta se encuentra con m3xima actividad gonadal (Tabla 3), destacando en este a3o IGS que no reflejaron el descenso caracter3stico en los meses de oto3o (Figura 3). A partir de junio el IGS increment3 con un registro por sobre el nivel hist3rico (IGS mensual 6,1%).




Figura 3 Comportamiento semanal del IGS en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013. (La l3nea representa el promedio hist3rico del IGS (referencial del evento reproductivo)).

De los resultados de los indicadores en la semana 46 se se3ala el predominio de anchoveta en desarrollo del evento reproductivo, con ovarios en fases de maduraci3n avanzada y con evidencia de desove.

La actividad desove, mediante el IAD, mostr3 por segunda semana consecutiva (semana 45 y 46) una ca3da con registro menor a 25% (23%), indicando la disminuci3n en la intensidad de desove, que de mantener la tendencia, la anchoveta en la zona norte habr3 finalizado su periodo de la m3xima intensidad de desove (MID: $IAD \geq 25\%$). El patr3n de desove (IAD) se3ala mayor intensidad entre mediados de julio y mediados de octubre, con m3ximos en las semanas de agosto y septiembre.