

Establece veda biológica reproductiva de anchoveta de las Regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

El D. Ex. N° 749/2013 que contiene los criterios para gatillar la veda biológica reproductiva de anchoveta de las Regiones Arica y Parinacota-Antofagasta, establece que: *“regirá una veda de 10 días corridos en el evento que al vencimiento de la veda fija, y durante el periodo referencial, se verifique un IAD \geq 35%. La veda regirá a partir del lunes siguiente a la publicación del reporte en la página web”.*

Lo informado por el Instituto de Fomento Pesquero, en su boletín reproductivo N° 40 correspondiente a la semana entre el 30 de septiembre y 06 de octubre de 2019 (adjunto), indica que prácticamente la totalidad de la anchoveta se encontró en proceso de maduración gonadal (IHAO, con nula incidencia de atresia (IAO), **con máxima actividad ovárica (IGS) y alta intensidad de desove (IAD), con un valor de IAD de 44,1%.**

En consideración a lo anterior, se establece una veda biológica reproductiva entre las 00:00 horas del día lunes 14 de octubre y las 23:59 horas del día 23 de octubre de 2019.



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 40

(Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta)

(30 septiembre al 6 octubre, 2019)

Convenio de Desempeño 2019

Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la zona norte de Chile, regiones Arica-Parinacota y Coquimbo, año 2019

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Octubre 2019

REQUIRENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Jefe Subsecretario de Economía y EMT

Ignacio Guerrero Toro

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Luis Parot Donoso

Jefe (I) División Investigación Pesquera

Sergio Lillo Vega

JEFA PROYECTO

M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos

Laboratorio Biol. Reproductiva - Iquique



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento macroscópico (mediante el IGS) y microscópico (mediante el IHA, IAD e IAO) de la evolución semanal del proceso de maduración gonadal y de desove de la anchoveta en la zona norte. A partir de la semana 23 (3 al 9 junio, 2019) se da inicio al monitoreo reproductivo intensivo entre las regiones Arica-Parinacota y Antofagasta.

Entre 25 de agosto y 8 de octubre, ambas fechas inclusive, la anchoveta en el área marítima de las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta se encuentra con veda biológica, según D. EX. N° 749 (Subpesca, julio de 2013), que establece un periodo de resguardo de veda fija por 45 días corridos (artículo 2°), con el objeto de reducir la mortalidad por pesca sobre el stock parental durante el periodo de máxima actividad reproductiva.

En este contexto, con el objetivo de monitorear el proceso de desove de la anchoveta durante el periodo de veda biológica, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura autorizó (R. EX N° 2981, agosto de 2019) al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de realizar una pesca de investigación denominado "Monitoreo del proceso de desove de anchoveta durante la veda biológica, regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 2019"

Paralelamente, la obtención de muestras para el monitoreo durante la veda se complementó con la ejecución por IFOP de la pesca de investigación denominado "Pesca de Investigación en el marco de la evaluación de stock desovante de anchoveta entre Arica y Parinacota y los 26°L.S., año 2019" (R. EX N° E-2019-005, septiembre de 2019), como fue en esta semana la prospección en las zonas de Iquique y Antofagasta.

En la Semana 40, a partir de la prospección con embarcaciones artesanales, se analizaron 315 hembras, en 13 lances que abarcaron las tres zonas de estudio (**Tabla 1**). Los tamaños fluctuaron en la zona de Arica entre 9,0 y 14,5 cm (modas: 10,5 cm y 12,5 cm; 51% bajo 12,0 cm), en la zona de Iquique entre 8,5 y 14,5 cm (modas: 11,0 cm y 12,5 cm; 62% bajo 12,0 cm) y en la zona de Antofagasta entre 11,0 y 13,5 cm (moda 12,5 cm; 13% bajo 12,0 cm). Los ejemplares analizados mostraron actividad ovárica desde los 8,5 cm.



Tabla 1

Cuadro de zonas prospectadas y lances realizados en el marco de la pesca de investigación, semana 40.

Zona/Embarcación	Zarpe	Recalada	Lance	Latitud	Longitud	Efectivo	No efectivo
1/Chenco	27-09 MPDH	29-sep	1	19°34'	70°16'	X	
			2	19°28'	70°16'		X
			3	19°11'	70°17'		X
			4	19°01'	70°20'	X	
			5	18°27'	70°21'		X
	30-sep	02-oct	1	19°33'	70°15'	X	
2/Chenco	30-sep	02-oct	2	19°35'	70°15'		X
			3	19°38'	70°13'	X	
			4	19°39'	70°13'		X
			5	20°07'	70°09'		X
2/Valencia	30/09 MPDH	01-oct	1	19°45'	70°11'	X	
			2	19°34'	70°14'	X	
			3	20°07'	70°09'		X
	2-10 MPDH	04-oct	1	21°24'	70°06'		X
			2	21°06'	70°09'		X
			3	20°50'	70°12'	X	
			4	20°47'	70°13'	X	
			5	20°38'	70°14'		X
	4-10 MPDH	06-oct	6	20°27'	70°10'		X
			1	19°53'	70°10'	X	
			2	19°40'	70°11'		X
			3	20°07'	70°09'		X
4			20°12'	70°11'		X	
5			20°27'	70°11'	X		
3/Javiera	30-sep	02-oct	6	20°17'	70°11'		X
			1	22°58'	70°19'	X	
			2	22°33'	70°20'		X
			3	22°49'	70°19'		X
			4	22°54'	70°17'	X	
			5	23°03'	70°26'		X
	02-10 MPDH	05-oct	6	23°02'	70°29'		X
			1	23°46'	70°29'	X	
			2	23°50'	70°31'	X	
			3	23°36'	70°26'	X	
			4	23°34'	70°27'	X	
			5	23°30'	70°29'		X
			6	23°35'	70°27'		X

Índice gonadosomático (IGS)

De acuerdo a este indicador, la anchoveta se mantiene con máxima actividad ovárica (Tabla 2; Figura 1).



Tabla 2
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta.

Semana (N°)	Fecha	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta					
		Macroscópico			Microscópico		
		IGS	n	IHA	IAD	IAO	n
23	03/06 - 09/06	1,9	488	53,0	0,0	4,3	255
24	10/06 - 16/06	2,5	495	61,0	0,7	11,9	285
25	17/06 - 23/06	3,5	817	83,0	4,4	5,4	315
26	24/06 - 30/06	3,5	558	89,0	4,4	1,7	294
27	01/07 - 07/07	3,8	598	88,0	8,7	4,7	276
28	08/07 - 14/07	4,5	474	87,0	7,9	10,0	329
29	15/07 - 21/07	4,4	502	80,0	4,1	17,1	292
30	22/07 - 28/07	4,1	767	72,0	2,9	26,1	306
31	29/07 - 04/08	4,7	341	91,0	5,3	6,7	300
32	05/08 - 11/08	5,5	409	95,0	14,5	4,3	256
33	12/08 - 18/08	6,3	399	99,0	7,6	1,3	303
34	19/08 - 25/08	6,6	406	98,0	8,9	2,3	304
35	26/08 - 01/09				Veda		
36	02/09 - 08/09	6,8	196	100	38,4	0,3	307
37	09/09 - 15/09	6,2	125	99,0	37,2	0,7	301
38	16/09 - 22/09	6,4	126	99,7	33,2	0,3	295
39	23/09 - 29/09	6,3	228	100	63,1	0,0	309
40	30/09 - 06/10	6,6	407	99,7	44,1	0,3	315




Figura 1 Evolución del índice gonadosomático (IGS) años 2018 – 2019 (punto blanco), y serie histórica 2000 – 2018. (La línea segmentada señala el valor IGS 5%, referencial del evento reproductivo).

Índice de hembras activas (IHA)

La incidencia de hembras sexualmente activas señaló prácticamente la totalidad de las hembras en proceso de maduración gonadal, acorde con el desarrollo del evento reproductivo, y a la tendencia histórica (Tabla 2; Figura 2).




Figura 2 Incidencia de hembras sexualmente activas (IHA) años 2018 – 2019 (punto blanco), y serie histórica 2001 – 2018.

Índice de actividad de desove (IAD)

El IAD fue 44%, evidenciando que la anchoveta en las tres zonas de estudio se mantiene con alta intensidad de desove, con registros $\geq 25\%$ (Tabla 2; Figura 3).




Figura 3 Evolución del índice de actividad de desove (IAD) años 2018 – 2019 (punto blanco), y serie histórica 1999 – 2018. (La línea segmentada representa el umbral de IAD 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).

Índice de atresia ovárica (IAO)

El IAO fue 0,3%, prácticamente sin evidencia de atresia, acorde con la máxima actividad ovárica y de desove (Tabla 2; Figura 4).




Figura 4 Evolución del índice de atresia ovárica (IAO) años 2018 – 2019 (punto blanco), y serie histórica 1999 – 2018.

Consideración final

De acuerdo a los indicadores, prácticamente la totalidad de la anchoveta se encontró en proceso de maduración gonadal (IHA), con nula incidencia de atresia (IAO), y se mantiene con máxima actividad ovárica (IGS) y con alta intensidad de desove (IAD).

Según los antecedentes, la anchoveta en la zona norte se encontró en desarrollo del evento reproductivo, y se mantiene con alta intensidad de desove, en su periodo de máxima intensidad de desove (MID: IGS > 6%; IAD ≥ 25%), que se fundamenta en el incremento de hembras hidratadas y de ovarios con folículos postovulatorios.

Glosario:

Índice gonadosomático (IGS): indicador de actividad que cuantifica los cambios del peso del ovario producto del desarrollo de los ovocitos.

Índice de hembras activas (IHA): indicador de actividad (histológico), como una proporción de hembras que evidencian algún grado de desarrollo de ovocitos, sin atresia masiva.

Índice de actividad de desove (IAD): indicador de la intensidad de desove (histológico), como una proporción de hembras que presentan ovocitos hidratados y/o folículos postovulatorios de estadios I-IV (hembras desovantes en la misma noche y/o una noche anterior a la captura).

Índice de atresia ovárica (IAO): indicador de atresia ovocitaria masiva (>50%), que refleja la finalización del evento reproductivo o algún factor perturbador del proceso de maduración gonadal y del desove.