



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 45

(XV, I, II REGIONES)

(4 al 10 noviembre 2013)

Convenio I: Asesoría Integral para la Pesca y Acuicultura, 2013

Proyecto 1.10. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / Noviembre 2013

REQUIRENTE **SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA**

Subsecretario de Economía
Tomás Flores Jaña

EJECUTOR **INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP**

Jefe División Investigación Pesquera
Jorge Castillo Pizarro

Director Ejecutivo
José Luis Blanco García

JEFA PROYECTO

M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento microscópico de la evolución de la actividad de desove semanal de este recurso, monitoreo que se realiza a través del análisis histológico de muestras de ovarios de ejemplares provenientes de diferentes zonas de pesca. En la semana 23 (3 al 9 junio, 2013) se dio inicio al monitoreo reproductivo de la anchoveta entre la XV y II Región.

Se entregan resultados de 147 hembras muestreadas en la semana 45 (4 al 10 noviembre, 2013) provenientes de la Zona de Arica (5 millas frente al puerto de Arica), de la Zona de Iquique (19 millas de Punta Rabo de Ballena y 33 millas de Punta Ballena) y de la Zona de Antofagasta (14 millas de Punta Algodonales y 15 millas de caleta Herradura de Mejillones).

La distribución de fases microscópicas mostró el predominio de ovarios en desarrollo avanzado (EMS 4 y 5), con un aporte relativamente bajo de hembras en condición de desove (EMS 6 a 8). Un 6% se presentó en regresión (EMS 9) (término del desove). No se observaron hembras en regeneración (EMS 2) y en vitelación inicial (EMS 3). Los resultados mostraron hembras en desarrollo reproductivo, pero con una caída en la incidencia de desove, destacándose por primera semana una mayor frecuencia de ejemplares que finalizaron el periodo reproductivo (Tabla 1).

Tabla 1

Incidencia de fases microscópicas de madurez de ovarios de anchoveta. Zona Arica-Antofagasta, semana 45.

	Fases ováricas microscópicas									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
n	0	0	0	79	22	0	0	37	9	147
%	0,0	0,0	0,0	53,7	15,0	0,0	0,0	25,2	6,1	

Las fases agrupadas indicadoras de actividad (EMS 3 a 8) señaló 90% de las hembras con actividad reproductiva (6 ovarios con atresia), de las cuales, 72% se presentó en desarrollo gonadal y 28% en desove (Tabla 2 y Figura 1).



Tabla 2
Análisis histológico de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 45.

Semana (N°)	Fecha 2013	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta					Número	
		Incidencia (%)					Activas	Total
		Hidratadas	FPO día 0	FPO día 1	FPO día 2	Desarrollo		
23	03/06 - 09/06	0,0	0,0	13,9	13,9	72,3	101	102
24	10/06 - 16/06	4,8	0,0	14,3	6,8	74,1	147	150
25	17/06 - 23/06	0,0	0,0	33,3	25,2	41,5	147	150
26	24/06 - 30/06	0,0	0,0	23,4	6,5	70,1	107	107
27	01/07 - 07/07	0,0	0,0	22,2	22,2	55,7	158	158
28	08/07 - 14/07	0,6	0,6	19,0	15,8	63,9	100	158
29	15/07 - 21/07	6,7	0,0	21,2	15,0	57,0	193	195
30	22/07 - 28/07	8,6	0,0	12,6	7,1	71,7	198	198
31	29/07 - 04/08	11,2	0,0	16,2	3,6	69,0	197	202
32	05/08 - 11/08							
33	12/08 - 18/08	13,4	0,0	15,8	10,3	60,5	253	254
34	19/08 - 25/08							
35	26/08 - 01/09	9,8	0,0	19,2	7,3	63,6	286	289
36	02/09 - 08/09							
37	09/09 - 15/09							
38	16/09 - 22/09							
39	23/09 - 29/09	4,6	0,0	40,3	7,1	48,0	196	197
40	30/09 - 06/10	0,0	0,0	39,5	7,0	53,5	215	215
41	07/10 - 13/10	1,5	0,0	31,3	4,5	62,6	198	199
42	14/10 - 20/10	1,5	0,0	25,1	3,1	70,3	195	196
43	21/10 - 27/10	0,0	0,0	27,2	6,2	66,7	195	196
44	28/10 - 03/11	0,0	0,0	39,7	9,3	51,0	151	152
45	04/11 - 10/11	0,0	0,0	24,2	3,8	72,0	132	147




Figura 1 Incidencia semanal de hembras activas (fases agrupadas 3 a 8), año 2011-2013.

En la Zona Norte, el índice de actividad de desove (IAD) en la semana 45 fue 22%, con 10% de atresia ovocitaria (Tabla 3). De acuerdo al comportamiento histórico del IAD (Figura 2), los desoves se intensifican en las semanas de julio con registros que se mantienen en valores relativamente altos hasta mediados de octubre (IAD: $\geq 25\%$).



Tabla 3
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 45.

Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta						
Semana (N°)	Fecha 2013	Macroscópico		Microscópico		
		IGS	n	IAD	IAO	n
23	03/06 - 09/06	6,2	75	13,7	0,0	102
24	10/06 - 16/06	5,6	136	18,7	0,0	150
25	17/06 - 23/06	5,6	120	32,7	0,0	150
26	24/06 - 30/06	7,2	107	23,4	0,0	107
27	01/07 - 07/07	6,6	243	22,2	0,0	158
28	08/07 - 14/07	6,1	232	20,3	0,0	158
29	15/07 - 21/07	6,5	204	27,7	1,0	195
30	22/07 - 28/07	9,2	135	21,2	0,0	198
31	29/07 - 04/08	8,1	380	26,7	2,5	202
32	05/08 - 11/08					
33	12/08 - 18/08			29,1	0,4	254
34	19/08 - 25/08					
35	26/08 - 01/09	7,8	342	28,7	0,7	289
36	02/09 - 08/09					
37	09/09 - 15/09					
38	16/09 - 22/09					
39	23/09 - 29/09	7,5	318	44,7	0,5	197
40	30/09 - 06/10	6,6	232	39,5	0,0	215
41	07/10 - 13/10	6,9	275	32,7	0,5	199
42	14/10 - 20/10	6,5	370	26,5	0,5	196
43	21/10 - 27/10	6,4	440	27,0	0,5	196
44	28/10 - 03/11	6,0	186	39,5	0,7	152
45	04/11 - 10/11	6,1	516	21,8	10,2	147




Figura 2 Comportamiento semanal del IAD e IAO en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013.
(La línea representa el umbral de IAD de 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).

De acuerdo al comportamiento del índice gonadosomático (IGS) la anchoveta se encuentra con máxima actividad gonadal (Tabla 3), destacando en este año IGS que no reflejaron el descenso característico en los meses de otoño (Figura 3). A partir de junio el IGS incrementó con un registro por sobre el nivel histórico (IGS mensual: 6,1%).




Figura 3 Comportamiento semanal del IGS en la Zona Arica – Antofagasta entre 2008 y 2013.
(La línea representa el promedio histórico del IGS (referencial del evento reproductivo)).

De los resultados de los indicadores en la semana 45 se señala el predominio de anchoveta en desarrollo del evento reproductivo, con ovarios en fases de maduración avanzada, pero con una caída en la incidencia de desove. Se destaca por primera semana una mayor frecuencia de hembras que finalizaron el periodo de desove, con un incremento del indicador de atresia (10%).

La actividad desove, mediante el IAD, indicó por primera semana desde inicios de agosto una caída con registro menor a 25% (22%), indicando la disminución en la intensidad de desove, que de mantener la tendencia en las semanas siguientes, la anchoveta en la zona norte habrá finalizado su periodo de la máxima intensidad de desove (MID: IAD \geq 25%). El patrón de desove (IAD) señala mayor intensidad entre mediados de julio y mediados de octubre, con máximos en las semanas de agosto y septiembre.