

COMITÉ CIENTÍFICO TÉCNICO BENTÓNICO  
INFORME TÉCNICO CCT-BENTÓNICO N° 06/2022



NOMBRE: CUOTA ANUAL DE CAPTURA PARA LOS RECURSOS HUIRO NEGRO, HUIRO PALO Y HUIRO FLOTADOR TEMPORADA 2022, Y RENOVACION DE LA VEDA EXTRACTIVA DE HUIRO PALO EN LA REGION DE ATACAMA

## 1. OBJETIVO

---

Analizar los antecedentes técnicos que permitan recomendar los criterios (rangos) para la determinación de la cuota anual de captura para los recursos huiro negro (*Lessonia berteriana/spicata*), huiro palo (*Lessonia trabeculata*) y huiro flotador (*Macrocystis pyrifera*), para la temporada anual 2022; y renovación de la veda extractiva de huiro palo en la Región de Atacama.

## 2. ANTECEDENTES

---

### 2.1 Antecedentes generales.

Las algas pardas chilenas son explotadas para la producción de alginatos, y en menor grado para alimento directo. Esta actividad económica se desarrolla a través de una compleja cadena productiva de alto impacto social y bajo valor agregado, focalizada en el norte de Chile. En la última década, los niveles de explotación se aproximaron a las 450.000 t secas anuales, generando casi US\$ 25 millones. Las algas pardas también tienen importancia social porque los algueros, pescadores artesanales y sus familias dependen parcial o totalmente de estos recursos. Más aún, la actividad de recolección o de extracción en algunos lugares es realizada por un grupo social caracterizado por extrema pobreza y marginalidad.

El huiro negro, es un recurso compuesto por dos especies crípticas, morfológicamente similares (Tellier *et al.*, 2011). Las poblaciones distribuidas al norte de los 30°S (Coquimbo) corresponden a *Lessonia berteriana*, mientras que las ubicadas al sur corresponden a *Lessonia spicata* (González *et al.*, 2012). En cambio, las poblacionales de huiro flotador *Macrocystis pyrifera* es una especie compuesta por dos ecomorfos denominados *M. pyrifera* y *M. integrifolia* (Macaya y Zuccarello, 2010).

En Chile, la pesquería de algas pardas reconoce un stock diferenciado en (a) una población natural que contiene la biomasa disponible para la explotación; y (b) una fracción de alga varada, que corresponde a la mortalidad natural que arriba a la playa. Este stock diferenciado está relacionado entre sí, en función de la dinámica poblacional del recurso (González *et al.*, 2002).

La pesquería de algas pardas es una pesquería bentónica particular porque históricamente se ha sustentado de la recolección de la mortalidad natural. La biomasa es destinada a la industria del alginato por lo que es secada, enfiada y vendida a comerciantes intermediarios en la playa, que las llevan a plantas picadoras y procesadoras ubicadas principalmente entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso (UNAP, 2010).

Los aspectos biológicos y ecológicos (*i.e.*, taxonomía, distribución, crecimiento, morfología, reclutamiento, reproducción, stock, mortalidad, estructura de tallas, relación longitud-peso, talla y edad crítica, evaluación indirecta, evaluación directa, medioambiente, oceanografía), así como pesqueros (*i.e.*, desembarque, esfuerzo de pesca, rendimiento de pesca) de huiro negro y huiro flotador están resumidos en varios informes técnicos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (*i.e.*, N°120/2013; N°55/2014).

Las algas pardas tienen importancia ecológica porque constituyen hábitat y refugio para la reproducción, el asentamiento larval y reclutamiento de varias especies de invertebrados y peces. En ambientes marinos costeros del norte de Chile los huiros actúan como especies fundacionales e ingenieras de ecosistemas, constituyendo focos de alta diversidad biológica, que alberga además otras especies de importancia económica y social (*e.g.*, lapas, loco, erizos, peces) (Vásquez *et al.*, 2010).

Debido al nivel de extracción del recurso algas pardas, y a fin de alcanzar un ordenamiento de esta pesquería para la zona norte (entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo), se han establecido regulaciones específicas e instancias de participación público-privada orientadas hacia un co-manejo sustentable. Este proceso permitió la elaboración de Planes de Manejo para el recurso algas pardas (*i.e.*, huiro negro, huiro palo, huiro flotador) fundamentados en bases científico/técnicas. Destacan las acciones de ordenamiento para las áreas de libre acceso a la pesca, a través de la regulación de acceso de nuevos usuarios a la pesquería - cierre temporal del Registro Pesquero Artesanal y las estrategias de explotación basadas en cuotas de capturas, vedas extractivas, talla mínima, y criterios de remoción de acuerdo a las características de cada especie de alga parda. Así como, la constante revisión del plan por parte del Comité y la incorporación de nuevas estrategias y/o medidas como límites de extracción, zonas de operación y nóminas de extracción.

En resumen, considerando los aspectos biológicos, ecológicos y pesqueros de las algas pardas y con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por el Plan de Manejo de la Región de Atacama, y las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, este Comité Científico Técnico recomienda las cuotas anuales de captura para los recursos huiro negro, huiro palo y huiro flotador en la Región de Atacama, para la temporada del año 2022; y la renovación de la veda extractiva de huiro palo.

## 2.2 Ley General de Pesca y Acuicultura. Artículo 3º literal c): fijación de cuotas anuales de captura

En el caso de las pesquerías de recursos bentónicos el Comité Científico Técnico establecerá criterios para la determinación del rango de cuota global, cuando corresponda, considerando la

información disponible y las particularidades de los recursos de que se trate. Podrán establecerse fundadamente las siguientes deducciones a la cuota global de captura. Es por ello, que el CCTB ha considerado determinar los rangos de cuota anual de captura por recurso y área de pesca.

**Cuota para investigación:** Se podrá deducir para fines de investigación hasta un 2% de la cuota de captura para cubrir necesidades de investigación. Para lo anterior, la Subsecretaría deberá informar al Consejo Nacional de Pesca los proyectos de investigación para el año calendario siguiente y las toneladas requeridas para cada uno de ellos. Dicho listado deberá publicarse en la página de dominio electrónico de la Subsecretaría.

### 2.3 Antecedentes del Comité de Manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama

El Comité de Manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama actualmente administra un plan de manejo que considera, entre otras, tres medidas de administración pesquera: el registro pesquero artesanal (con acceso suspendido transitoriamente), una cuota anual de captura y una veda extractiva.

El Dcto. Ex. N° 826/2017 modificado por el Dcto. Ex. N° 62/2019, establece la veda extractiva de los recursos huiro negro y huiro flotador en el área marítima de la Región de Atacama, para los años 2018 y 2021, inclusive renovable a partir del 2022 en adelante, ya que la medida es de carácter obligatorio. Durante los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre. La especificación de la veda indica la prohibición del barroteo o remoción activa y el segado, pero permite la recolección del varado a través de una cuota.

El D. Ex. electrónico N° 79 del 01 de octubre de 2020, establece veda extractiva recurso huiro palo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y 2021 en el área marítima de la Región de Atacama, renovable a partir del 2022 en adelante, ya que la medida es de carácter obligatorio.

La Resolución Exenta N°404/2019 de la SUBPESCA, modificó la R. Ex. N°2672/2013 que aprobó el Plan de Manejo para los recursos huiro negro, huiro palo y huiro flotador en el área de libre acceso de la Región de Atacama. En este contexto, se modificaron las estrategias de explotación en relación a los periodos de veda extractiva, la incorporación de zonas de operación por provincias, la distribución espacial provincial de la cuota de captura y el establecimiento de una nómina de pescadores participantes por provincia.

Complementariamente, el Comité de Manejo de Algas Pardas en Atacama, a fin de propender hacia un consumo responsable y razonable de las cuotas de algas por los agentes comercializadores, ha estado evaluando técnicamente la pertinencia de establecer un límite de extracción diario para los tres recursos de la pesquería de algas pardas. En este contexto, la Resolución Exenta N°1700/2020 establece un límite de extracción diario para la embarcación artesanal de 2,26 toneladas, en estado húmedo para el recurso huiro palo en el área marítima de la Región de Atacama.

En el Plan de Manejo del Comité de Manejo de Algas Pardas de Atacama la cuota considera la biomasa (i.e., *Lessonia*, *Macrocystis*) en el agua o en su estado natural considerando el 100% de humedad. Además, presenta una distribución temporal dividida en cuatro trimestres (i.e., ene-feb-mar, abr-may-jun, jul-ago-sept, oct-nov-dic), una distribución espacial que divide el territorio en zonas de operación o provincias (i.e., Chañaral, Copiapó, Huasco), y un ítem en la forma de imputación: solo Varado (V), Varado más Barreteado para *Lessonia* (V+B), Varado más Segado para *Macrocystis* (V+S). Cabe destacar que todas las medidas están relacionadas entre sí.

**Cuota de huiro negro (V+B) y huiro flotador (V+S).** Los meses de extracción directa (i.e., barreta para huiro negro, segado o corte para huiro flotador), que corresponden a marzo, septiembre y diciembre de cada año, fueron seleccionados por el sector pesquero artesanal argumentando aspectos sociales y económicos, lo cual fue avalado por el Comité de Manejo (Figura 1 y Figura 2). Asimismo, responde al compromiso del Comité de Manejo por disminuir paulatinamente el barroteo o segado.

**Cuota de huiro palo (V y B).** Los meses de extracción directa (i.e., barreta para huiro palo), abarcan al primer, segundo y tercer trimestre de cada año; en cambio, la recolección de varado de huiro palo puede ser realizada durante todo el año (Figura 3).

**Veda extractiva (huiro negro y huiro flotador).** El Comité de Manejo de Atacama continúa enfocado en la disminución paulatina de la extracción directa (barroteo o segado) de huiro negro y huiro flotador. Complementariamente, de manera reiterada, el Comité Científico Técnico Bentónico también ha discutido la eliminación de la remoción activa de plantas de huiro negro en la pesquería de algas pardas. Si bien, el Comité de Manejo aumentó el periodo de veda para huiro negro y huiro flotador a 9 meses (Figura 1, Figura 2), el varado permitido para la recolección, no queda exento de la cuota de captura del ítem varado, por ende, es un varado con límites.

**Veda extractiva (huiro palo).** El Comité de Manejo de Atacama también ha dirigido sus acciones a disminuir paulatinamente la extracción directa (barroteo) de huiro palo, por ejemplo, implementando una veda en el cuarto trimestre del año (Figura 3). Esta medida de manejo está enfocada a proteger la actividad reproductiva de las poblaciones de huiro palo y el crecimiento de las plantas. Sin embargo, se requiere un monitoreo de las poblaciones de huiro palo para validar empíricamente estas observaciones.

**Figura 1.** Calendario de veda para huiro negro en la Región de Atacama. (V=Varado; B=Extracción; rojo corresponde a periodo en veda y se prohíbe el barreteo, solo recolección de varado; mientras que en verde corresponde a periodo sin veda; permite recolección y barreteo).

CALENDARIO DE VEDA HUIRO NEGRO												
Trimestre	1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre		
Mes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ítem cuota	Varado		V + B	Varado			Varado		V + B	Varado		V + B

**Figura 2.** Calendario de veda para huiro flotador en la Región de Atacama. (V=Varado; S=Extracción; rojo corresponde a periodo en veda y se prohíbe el segado, solo recolección de varado; mientras que en verde corresponde a periodo sin veda; permite recolección y segado).

CALENDARIO DE VEDA HUIRO FLOTADOR												
Trimestre	1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre		
Mes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ítem cuota	Varado		V + S	Varado			Varado		V + S	Varado		V + S

**Figura 3.** Calendario de veda para huiro palo en la Región de Atacama. (V=Varado; B=Extracción; rojo corresponde a periodo en veda y se prohíbe el barreteo, solo recolección de varado; mientras que en verde corresponde a periodo sin veda; permite recolección y barreteo).

CALENDARIO DE VEDA HUIRO PALO												
Trimestre	1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre		
Mes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ítem cuota	V + B			V + B			V + B			Varado		

**Zonas y nóminas de operación.** La Región de Atacama está subdividida en zonas de operación que corresponden a las tres provincias costeras: Huasco, Copiapó y Chañaral (Tabla 1). Además, donde se ha subdividido el RPA de acuerdo al lugar de inscripción (caleta base) generando una nómina de pescadores artesanales subdividida en las tres provincias, respectivamente.

Tabla 1. Distribución porcentual de la cuota de captura de huiro negro, huiro palo y huiro flotador por provincia en la Región de Atacama.

DISTRIBUCIÓN % CUOTA CAPTURA			
PROVINCIA	Huiro negro (HN)	Huiro palo (HP)	Huiro Flotador (HF)
CHAÑARAL	19	6	1
COPIAPÓ	37	27	45
HUASCO	43	68	55

**Reglas de imputación:** un pescador artesanal podrá extraer/recolectar en toda la Región de Atacama, pero solo podrá declarar su estadística en el lugar de inscripción según la zona de operación. Una vez consumida la cuota de una zona, se cierra la cuota hasta el siguiente periodo y los pescadores artesanales inscritos en esa zona no podrán operar hasta su apertura.

#### 2.4 Análisis de antecedentes técnicos disponibles para justificar el rango de cuota para el huiro negro, huiro palo y huiro flotador en la Región de Atacama.

El Comité de Manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama modificó algunas medidas del Plan de Manejo para mejorar la conservación de los recursos algas pardas; enfocado principalmente en medidas de manejo complementarias a las medidas de conservación de cuotas y vedas extractivas, tal como, el periodo de veda de 9 meses para el huiro negro y huiro flotador, y de 3 meses para el huiro palo. Una acción complementaria del Plan de Manejo solicitada por el Comité de Manejo fue distribuir la cuota según zona de operación y por cada provincia.

Las evaluaciones directas realizadas para monitorear la pesquería de Algas Pardas en la Región de Atacama, continúan detectando procesos de juvenalización de las plantas de huiro negro, estaría relacionado con la extracción directa y permanente, y ha generado poblaciones constituidas por reclutas y juveniles (CESSO 2014, ECOS 2020).

De acuerdo a ECOS (2014), el largo de las frondas de las plantas es gravitante en el proceso de varado, debido a que mientras más grandes sean las plantas mayores es la probabilidad de desprendimiento de éstas. En el estudio realizado por CESSO (2014), se observó que cuando se disminuye o se suspende la actividad de barroteo, la estructura poblacional de huiro negro, basado en los diámetros de los discos de adhesión presentó una proporción representativa de plantas adultas aptas para la cosecha (> 20 cm de diámetro del disco de adhesión), además de las plantas juveniles y reclutas. Estos antecedentes sugieren prohibir la extracción directa (barroteo) durante períodos extensos del año. Además, este mismo estudio sugiere que una fracción importante de la biomasa desembarcada de huiro negro y huiro palo en la Región de Atacama proviene de varaderos o de algas varadas a lo largo de la costa (CESSO, 2014).

En relación con desembarque/captura<sup>1</sup>, se observa una marcada estacionalidad para huiro negro *Lessonia berteroana/spicata* con máximo hacia la época estival y mínimos hacia la época invernal. Durante el año, se detectan marcados máximos de desembarque/captura de huiro negro al comienzo de cada trimestre debido a la apertura de la cuota trimestral.

La biomasa del recurso huiro flotador *Macrocystis pyrifera* es preferentemente recolectado varada y su destino es fraccionado para la industria de secado y para los centros de cultivo de abalones. El mayor desembarque/captura de huiro flotador ocurre entre noviembre y mayo de cada año, en sincronía con el ciclo de crecimiento descrito para la Región de Atacama; no obstante, durante el año 2021 se detectó un marcado incremento durante el primer trimestre.

El desembarque/captura de huiro palo *Lessonia trabeculata* ocurre durante todo el año, aunque se detectan marcados máximos de desembarque/captura al comienzo de cada trimestre, momento en que ocurre la apertura de la cuota trimestral.

**Huiro Negro:** La cuota de captura de huiro negro para el año 2021 fue de 61.551 t (61.545 t cuota de extracción + 6 t de cuota de investigación) de acuerdo al Decreto Exento Folio N°202000118 de 2020, y con una distribución trimestral y provincial indicada en la Resolución exenta N°17/08.01.2021, posteriormente modificada en Res. Ex. N°10/13.08.2021 y N°12/07.09.2021. A través de los años de aplicación del Plan de Manejo, la cuota (desembarque/captura) ha tenido un saldo anual con valores variables, y en general negativos. Esto indica una fracción de sobreconsumo de la cuota de captura anual. No obstante, cabe destacar que en los últimos tres años (2018, 2019, 2020), el saldo de la cuota de captura ha oscilado entre -6% y -8%. Para el cuarto trimestre del año 2021 queda un saldo disponible de 0% de la cuota de huiro negro para la Región de Atacama (Tabla 3).

De acuerdo a una solicitud del Comité de Manejo de algas pardas de la Región de Atacama, basada en el varamiento de biomasa de huiro negro durante marejadas anómalas ocurridas en otoño e invierno 2021, se aumentó la cuota en 3.500 toneladas de alga varada de huiro negro según lo indicado en el Dcto. Ex. Folio N°170-2021. Complementariamente se realizó una redistribución de la cuota trimestral y provincial de acuerdo a lo indicado en la Resolución Exenta N°2669/01.10.2021.

**Tabla 3.** Distribución de las cuotas basado en el desembarque (2014-2016) y la captura (2017-2021) para huiro negro. (Desembarque: valor de transacción; Captura: valor de transacción llevado a peso húmedo con factores de conversión)

Cuota y Desembarque/Captura huiro negro					
Cuota	Año	Cuota	Desem./Capt.	Saldo +/-	%
Desembarque	2014	64.000	67.019	-3.019	-5

<sup>1</sup> Entiéndase como "desembarque" el valor en kilos declarado por el o la usuaria (RPA) indicando 1 de los 4 estados de humedad; y la "captura" es el valor de desembarque convertido a alga húmeda o en estado natural considerando cualquiera de los 4 estados de humedad declarados por el/la usuario/a.

	<b>2015</b>	55.141	71.127	-15.986	-29
	<b>2016</b>	47.952	68.873	-20.921	-44
<b>Captura</b>	<b>2017</b>	60.312	83.652	-23.340	-39
	<b>2018</b>	61.545	66.676	-5.131	-8
	<b>2019</b>	61.545	66.390	-4.845	-8
	<b>2020</b>	61.545	65.334	-3.789	-6%
	<b>2021</b>	65.051	65.051	0	0%

**Huiro flotador:** La cuota de captura de huiro flotador para el periodo 2021 fue de 2.284 t (2.281 t cuota de extracción + 3 t de cuota de investigación) Dcto. Ex. Folio N°202000118 de 2020, y con una distribución trimestral y provincial indicada en la Res. Ex. N°17/08.01.2021. La cuota de captura de huiro flotador también ha tenido un saldo variable con valores negativos, lo cual indica una fracción de sobreconsumo (Tabla 3). En el año 2020, una fracción importante de la cuota fue destinada al ítem varado (V), porque el huiro flotador es extraído principalmente por recolectores de orilla, con un saldo de la cuota de captura de -15%. Para el segundo semestre del 2021, queda un saldo de +55% de la cuota de captura de huiro flotador para la Región de Atacama (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución de las cuotas basado en la captura (2017-2021) para huiro flotador. (Desembarque: valor de transacción; Captura: valor de transacción llevado a peso húmedo con factores de conversión).

<b>Cuota y Desembarque/Captura huiro flotador</b>					
<b>Cuota</b>	<b>Año</b>	<b>Cuota</b>	<b>Desem./Capt.</b>	<b>Saldo +/-</b>	<b>%</b>
<b>Captura</b>	<b>2017</b>	2.284	4.239	-1.955	-86
	<b>2018</b>	2.284	2.430	-146	-6
	<b>2019</b>	2.284	2.687	-403	-18
	<b>2020</b>	2.284	2.692	-407	-15
	<b>2021</b>	2.284	1.475	809	55

**Huiro Palo:** La cuota de captura de huiro palo para el periodo 2021 fue de 14.419 t (14.413 t cuota de extracción + 6 t de cuota de investigación de acuerdo con el Dcto. Ex. Folio N°202000118 del año 2020, y con una distribución trimestral y provincial indicada en la Res. Ex. N°17/08.01.21, posteriormente modificada según Res. Ex. N°06/22.06.2021. Además, desde el año 2020, se ha separado la cuota en 40% Varado y 60% Barreteado, dado que el alga es extraída principalmente por la categoría de buzo. A través de los años de aplicación del Plan de Manejo, la cuota de captura de huiro palo también ha tenido un saldo con valores variables, y en general negativos, indicando otra vez sobreconsumo (Tabla 3). Aunque los años 2018 y 2019, el saldo de la captura oscilo entre -8% y -10% (Tabla 5). Para el cuarto trimestre del año 2021, el saldo es de -3% de la cuota de huiro palo en la Región de Atacama (Tabla 5); sin embargo, corresponde al período donde se aplica veda.

Tabla 5. Distribución de las cuotas basado en la captura (2017–2021) para huiro palo. (Desembarque: valor de transacción; Captura: valor de transacción llevado a peso húmedo con factores de conversión)

Cuota y Desembarque/Captura huiro palo					
Cuota	Año	Cuota	Desem./Capt.	Saldo +/-	%
Captura	2017	13.690	17.578	-3.888	-28
	2018	13.690	14.835	-1.145	-8
	2019	13.690	15.093	-1.403	-10
	2020	13.690	17.004	-3.314	-24
	2021	13.690	14.153	-463	-3

### 3. ANALISIS

#### 3.1 HUIRO NEGRO

Se mantiene el valor del rango recomendado de la cuota total *statu quo* respecto del rango superior de la cuota 2021. Además, el actual Plan de Manejo de Algas Pardas de la región, considera un periodo de veda extractiva de 9 meses, permitiéndose el barroteo solo en los meses de marzo, septiembre y diciembre y se permite exclusivamente la recolección de varado natural en playa de mar en los meses de: enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre, asociado a una cuota en el ítem de varado.

El 0,01% del límite superior del rango de cuota de captura, es destinado a la cuota para investigación.

El aumento de cuota de captura de huiro negro en el periodo 2021, no fue considerado en el análisis dado que éste se realizó en forma excepcional (i.e., marejadas anómalas invernales). Además, queda en atención a los compromisos por parte de la SSPA referidos al levantamiento de información para macroalgas durante el periodo 2022.

#### 3.2 HUIRO PALO

Se mantiene *statu quo* respecto de la cuota 2021. Además, el actual plan de manejo de algas pardas de la región considera un periodo de veda extractiva de 3 meses, permitiéndose el barroteo y la recolección de varado entre enero y septiembre y exclusivamente recolección de varado natural en playa de mar en los meses de: octubre, noviembre y diciembre, asociado a una cuota en el ítem de varado. Nuevamente, se recomienda para el 2022, que el Comité de Manejo de algas pardas de esta región, continúe dando énfasis al funcionamiento de esta pesquería.

El 0,04% del límite superior del rango de cuota de captura, es destinado a la cuota para investigación.

Se sugiere al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura SERNAPESCA que revise la estadística de este recurso para la zona norte. En este contexto, la información pesquera debería informar el peso de la planta completa, al igual que el resto de los huiros; actualmente, en algunas zonas de operación, se informa solo el peso del tronco y el disco de adhesión de la planta, debido al desoje en bote. Por lo cual se debería utilizar algún factor de conversión que recoja la pérdida por desoje (20% o 30% aproximadamente) y se agregue ese valor a la estadística. Al respecto, esto implicaría eventualmente, realizar también ajustes al *status quo* en virtud de la consistencia de la información.

Respecto a la veda extractiva de huiro palo *Lessonia trabeculata*, los antecedentes presentados sugieren renovar la veda por un periodo de 3 años, desde octubre a diciembre. Exceptuando de la veda extractiva el recurso varado naturalmente (en playa de mar). El análisis consideró los argumentos y recomendaciones del Informe Técnico N°07 del CCTB "Veda extractiva recurso huiro palo en área marítima de libre acceso de la Región de Atacama, año 2021".

### 3.3 HUIRO FLOTADOR

Se mantiene el valor del rango recomendado de la cuota total en *statu quo* respecto de la cuota 2021. Además, el actual Plan De Manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama considera un periodo de veda extractiva de 9 meses, permitiéndose el segado solo en los meses de marzo, septiembre y diciembre y exclusivamente recolección de varado en los meses de: enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre.

Se recomienda explorar la posibilidad de establecer subcomités de manejo locales para el huiro flotador, considerando que el CCTB ha conocido una nueva metodología de evaluación para este recurso (e.g., praderas de Bahía Chasco).

El 0,13% del límite superior del rango de cuota de captura, es destinado a la cuota para investigación.

Se recomienda que la SSPA solicite al SERNAPESCA aclarar la procedencia de los datos de desembarques de huiro flotador (i.e., ALA, AMERB, o ambas) que se entregan en el anuario estadístico.

#### 4. RECOMENDACIÓN

- Para huiro negro *Lessonia berteroa*/*spicata*, se recomienda mantener status quo respecto al rango de cuota otorgado para el periodo 2021, correspondiente a 49.241-61.551 toneladas (que incluyen 6 toneladas para pesca de investigación). Lo cual considera 51.132 toneladas para el ítem Varado (V), 10.413 toneladas para el ítem de Varado + Barreteado (V+B), y 6 toneladas para cuota de investigación.

RECURSO	Criterio /observaciones CCTB	Deducciones cuota (t)			RANGO DE CUOTA RECOMENDADA (t) 2022
		Varado	Varado + Barreteado	Investigación	
<b>HUIRO NEGRO</b> <i>Lessonia berteroa/spicata</i>	<p>Se mantiene el <i>statu quo</i></p> <p>Se deja consignado que el aumento de cuota no se consideró en el análisis dado que éste se realizó en forma excepcional en atención a los compromisos por parte de la SSPA referidos al levantamiento de información para macroalgas para el año 2022.</p> <p>El 0,01% del límite superior del rango de cuota de captura, es destinado a la cuota para investigación. Ante un aumento de Pescas de Investigación, se deberían reportar los eventuales sobreconsumos de esta cuota, para contemplarlas en próximas deducciones de cuota.</p>	51.132	10.413	6	49.241-61.551

- Para huiro palo *Lessonia trabeculata*, se recomienda mantener status quo respecto al rango de cuota otorgado para el periodo 2021, correspondiente a 11.535-14.419 toneladas (que incluyen 6 toneladas para pesca de investigación). Lo cual considera destinar el 40% de la cuota al ítem de Varado (V), y el 60% al ítem de Barreteado (B), según lo recomendado por el Comité de Manejo y establecido en el Plan de Manejo, y 6 toneladas para cuota de investigación.

RECURSO	Criterio /observaciones CCTB	Deducciones cuota (t)			RANGO DE CUOTA RECOMENDADA (t) 2022
		Varado	Varado + Barreteado	Investigación	
<b>HUIRO PALO</b> <i>Lessonia trabeculata</i>	<p>Se mantiene el <i>statu quo</i> establecido para este recurso</p> <p>El 40% de la cuota será destinado al ítem varado y la extracción activa o barreteado correspondiente al 60% de la cuota, considera el desojo que se le hace a este recurso.</p> <p>Se hace la sugerencia al Sernapesca que revise la estadística de este recurso para la zona norte, ya que no debería informar solo el peso del tronco de la planta, sino que al igual que el resto de los huiros, se debe informar el peso de la planta</p>	723	13.690	6	11.535-14.419

	<p>completa, por lo que se debería utilizar algún factor que recoja la pérdida por desoje y se agregue ese valor a la estadística. Al respecto, esto implicaría eventualmente, realizar también ajustes al <i>status quo</i> en virtud de la consistencia de la información.</p> <p>El 0,04% del límite superior del rango de cuota de captura, es destinado a la cuota para investigación.</p>				
--	---	--	--	--	--

- Para **huiro flotador**, se recomienda mantener ***status quo*** respecto al rango de cuota otorgado para el periodo 2021, correspondiente a 1.827-2.284 toneladas (que incluyen 3 toneladas para pesca de investigación). Lo cual considera **456 toneladas** para ítem Varado (V), **1.825 toneladas** de Varado + Segado (V+S), y 3 toneladas para cuota de investigación.

RECURSO	Criterio /observaciones CCTB	Deducciones cuota (t)			RANGO DE CUOTA RECOMENDADA (t) 2022
		Varado	Varado + Barreteado	Investigación	
<b>HUIRO FLOTADOR</b> <i>Macrocystis pyrifera</i>	<p>Se mantiene el <i>statu quo</i> establecido para este recurso</p> <p>Se recomienda que la SSPA solicite al Sernapesca, aclarar la procedencia de los datos de desembarques de este recurso (ALA, AMERB, o ambas) que se entregan en el anuario estadístico.</p> <p>El 0,13% del límite superior del rango de cuota de captura, es destinado a la cuota para investigación.</p>	1.825	456	3	1.827-2.284

- La cuota anual será distribuida temporalmente en trimestres, tanto para V+B/V+S/B, como la cuota de varado.

- En relación al control y la aplicación de la cuota, todo desembarque de huiro flotador (excluyendo el sector de Bahía Chasco), procedentes de recolección manual de recurso varado naturalmente en playa o pozones y segado (corte del dosel a 1,5 m).

- Una vez agotada la totalidad de la cuota de V+B/V+S/B, solo se podrá recolectar alga desprendida naturalmente y varada en playa de mar, la que deberá ser imputada a la cuota denominada "varado".

- Una vez desembarcada la totalidad de la cuota de los V+B/V+S/B, respectivamente se deben suspender las actividades extractivas y de recolección.

- La cuota de huiro negro, huiro palo y huiro flotador fue estimada considerando el 100% de humedad.

- Los sobreconsumos y saldos registrados en cada uno de los trimestres serán imputados al periodo siguiente.

#### **Renovación de la cuota de huairo palo *Lessonia trabeculata***

- Renovar la veda extractiva para el recurso huairo palo *Lessonia trabeculata* en la Región de Atacama por un periodo de 3 años, entre octubre y diciembre 2022-2024 inclusive.

- Exceptuar de la veda extractiva el recurso varado naturalmente (en playa de mar), autorizando la recolección manual de estas especies, así como su comercialización, transporte, procesamiento, elaboración, transformación y almacenamiento de las mismas especies y de los productos derivados de ella.

- Exceptuar de la veda extractiva las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), Reservas Marinas, Espacios Costeros de Pueblos Originarios (EMCPO) y las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), que tengan el recurso huairo palo como especie principal dentro de su plan de manejo o de administración vigente.

## 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

Canales, C. M., Hurtado, C., & Techeira, C. 2018. Implementing a model for data-poor fisheries based on steepness of the stock-recruitment relationship, natural mortality and local perception of population depletion. The case of the kelp *Lessonia berteriana* on coasts of north-central Chile. *Fisheries Research*: 198: 31-42.

CESSO. 2014. Seguimiento biológico pesquero y evaluación económica, como insumo para Plan de Manejo de la Pesquería de Algas Pardas III Región, 2013-2014. Proyecto 2013-107-DAP-28.

ECOS. 2014. Seguimiento biológico pesquero y evaluación económica, como insumo para Plan de Manejo de la Pesquería de Algas Pardas IV Región, 2013-2014. Proyecto 2013-107-DAP-28.

ECOS. 2020. Evaluación de biomasa y análisis del estado de explotación de las praderas naturales de algas pardas (huir negro, huir palo y huir flotador) en las áreas de libre acceso de la región de Atacama y Coquimbo. Informe Final FIPA 2017-53

González, A., J. Beltrán, L. Hiriart, V. Flores, B. de Reviers, J.A. Correa & B. Santelices. 2012. Identification of cryptic species in the *Lessonia nigrescens* complex (Phaeophyceae, Laminariales). *J. Phycol.*, 48(5): 1153-1165.

González, J., C. Tapia, A. Wilson, J. Garrido y M. Avila. 2002. Estrategias de explotación sustentable de algas pardas en la zona norte de Chile. Informe Técnico FIP, FIP/IT 2000-19.

Macaya, E. y Zuccarello, C. 2010. DNA Barcoding and genetic divergence in the Kelp *Macrocystis* (Laminariales). *Journal of Phycology* 46(4), 736-742.

UNAP (Universidad Arturo Prat). 2012. Programa de manejo, cultivo y repoblamiento para las algas pardas en la región de Tarapacá. Informe de Final. Proyecto FIC Regional.

Vásquez, J.A., N. Piaget, F. Tala, J.M.A. Vega, A. Bodini, S. Morales, L. Jorquera, C. Sáez, y P. Muñoz. 2010. Evaluación de la biomasa de praderas naturales y prospección de potenciales lugares de repoblamiento de algas pardas en la costa de la XV, I y II regiones. Informe Final Proyecto FIP 2008-38.