

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 6 (SEMANA 33, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 10 y el 16 de agosto del 2026, se indica que:

- Entre las Regiones de Valparaíso a La Araucanía y bajo la aplicación del principio precautorio frente a la recurrente evidencia de muestreos con alta actividad reproductiva para sardina común y anchoveta en las semanas 32 y 33 **se extiende el periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta, hasta la próxima evaluación semanal.**
- Para la Región de Los Ríos, se mantiene el periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta.

Conforme a lo anterior, se indica que, entre las Regiones de Valparaíso a La Araucanía (incluyendo la Región del Biobío), **se mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta**, la cual será evaluada en el próximo reporte del jueves 27 de agosto, el cual será publicado en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 13 : semana 33 (10 al 16 de agosto 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso				S. COMÚN									Veda biológica reproductiva.
	Ñuble (Itata)	36°23'48" - 72°53'36" 36°29'42" - 72°56'06"	Vegas de Itata Pudá	S. Común 60,3% Anchoveta 4,2% Pampanito 33,2% Otras sp. 2,3%	S. COMÚN	30,2	1	30,2	229	8,0 - 16,0	14,0	21,8	0,3	PINV. 1 viaje (2 lances). Recurso escaso. Se realiza lance dentro de la milla, al W de Río Itata y a 1,5 millas al W de Pudá. No se realiza un tercer lance, debido a la ausencia del recurso. Otras sp: lenguado, pejerrey y bagre.
					ANCHOVETA	2,1		2,1	170	7,0 - 17,0	9,0	84,5		
	Biobío (B. Concepción)													PINV. 1 viaje, 1 lance sin pesca. Se recorre la zona sin resultados. Fuerte viento impide seguir la búsqueda.
	Biobío (G. de Arauco)													PINV. 1 viaje sin lance. Ausencia del recurso. Se recorre toda la costas desde Punta Lavapié, Llico, Tubul, Coronel.
	Total Ñuble-Biobío	36°23'48" - 72°53'36" 36°29'42" - 72°56'06"	Vegas de Itata Pudá	S. Común 60,3% Anchoveta 4,2% Pampanito 33,2% Otras sp. 2,3%	S. COMÚN	30,2	1	30,2	229	8,0 - 16,0	14,0	21,8	0,3	PINV. 3 viajes: 3 lances (uno sin pesca). Recurso escaso en toda la macrozona. Se registra un viaje sin lances. Otras sp.: lenguado, pejerrey y bagre.
					ANCHOVETA	2,1		2,1	170	7,0 - 17,0	9,0	84,5		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°20'16" - 73°15'34" 39°22'08" - 73°16'26"	Cayulfú Los Pinos	S. Común 68,4% Pampanito 18,4% Mote 13,2%	S. COMÚN	103,0	1	103,0	314	7,5 - 15,0	12,0	32,0	2,8	PINV 1 viaje (3 lances). En primer lance predominio de pampanito por sobre la sardina común. Se destaca alta presencia de lobos en todos los lances. Ausencia de anchoveta.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°30'33" - 73°16'58" 39°35'17" - 73°19'17"	Chanchan Piedra Blanca	S. Común 61,5% Anchoveta 38,5%	S. COMÚN	61,0	1	61,0	236	8,5 - 15,5	10,5	75,3	1,3	PINV.1 viaje (2 lances). No es posible un tercer lance, debido a fuerte viento y oleaje en la zona. Durante virado de lance 2, se observa robato y salmón Chinook.
					ANCHOVETA	39,0		39,0	102	9,5 - 16,0	11,5	61,8		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín Nº 13 : semana 33 (10 al 16 de agosto 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	Nº TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (nº)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	143	7,5	Inactivas: 0,7% III : 95,8% IV: 2,1% V: 1,4%	97,9%	222	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)						Lance sin pesca. Fuertes corrientes en la zona.
	Biobío (G. de Arauco)						Ausencia del recurso en zona prospectada.
	Total Ñuble - Biobío	143 ^(*)	7,5	Inactivas: 0,7% III : 95,8% IV: 2,1% V: 1,4%	97,9%	222	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	133	5,6	Inactivas: 18,8% III : 80,5% IV: - V: 0,8%	80,5%	240	Actividad reproductiva alta.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	99	6,2	Inactivas: 31,3% III : 65,7% IV: 3,0% V: -	68,7%	160	Actividad reproductiva alta.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	56 ^(*)	3,1	Inactivas: 55,4% III : 44,6% IV: - V: -	44,6%	146	Actividad reproductiva moderada
	Biobío (B. Concepción)						Lance sin pesca. Fuertes corrientes en la zona.
	Biobío (G. de Arauco)						Ausencia del recurso en zona prospectada.
	Total Ñuble - Biobío	56 ^(*)	3,1	Inactivas: 55,4% III : 44,6% IV: - V: -	44,6%	146	Actividad reproductiva moderada
	La Araucanía (Toltén-Queule)						Ausencia del recurso en lance.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	56 ^(*)	3,0	Inactivas: 71,4% III : 28,6% IV: - V: -	28,6%	80	Actividad reproductiva baja

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo


BTMM: Bajo Talla Media de Madurez

MME: Muestras en Mal Estado

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 13 : semana 33 (10 al 16 de agosto 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 13 : semana 33 (10 al 16 de agosto 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	11-ago 14:20	Coliumo	embarcado L1	140	36°23'48" - 72°53'36"	Ñuble (Itata)	S. Común	24,7	10,0 - 16,0	14,0	9,5	0,0	7,8	100	41	900
L/M Capello	733	17,1	11-ago 14:20	Coliumo	embarcado L1	140	36°23'48" - 72°53'36"		Anchoveta	0,4	10,0 - 17,0	12,5	25,8	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	11-ago 14:20	Coliumo	embarcado L2	141	36°29'42" - 72°56'06"		S. Común	5,5	8,0 - 14,5	10,0	76,9	1,5	6,3	92,1	90	900
L/M Capello	733	17,1	11-ago 14:20	Coliumo	embarcado L2	141	36°29'42" - 72°56'06"		Anchoveta	1,8	7,0 - 16,0	9,0	96,3	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	11-ago 19:30	Talcahuano	embarcado L1	142	36°39'54" - 73°01'54"	Biobío (B. Concepción)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	12-ago 11:30	San Vicente				Biobío (G. de Arauco)	VSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Juan M S	3598	17,9	11-ago 16:15	Mehuín	embarcado L1	143	39°20'33" - 73°16'17"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	32,0	9,0 - 15,0	12,0	17,8	0,0	6,0	82,4	75	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	11-ago 16:15	Mehuín	embarcado L2	144	39°20'16" - 73°15'34"		S. Común	50,0	8,0 - 14,5	12,0	33,6	1,8	5,3	76,7	82	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	11-ago 16:15	Mehuín	embarcado L3	145	39°22'08" - 73°16'26"		S. Común	21,0	7,5 - 14,0	11,5	50,0	9,6	5,3	82,1	99	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	12-ago 16:32	Corral	embarcado L1	146	39°30'33" - 73°16'58"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	S. Común	50,0	8,5 - 12,0	10,5	86,9	1,5	3,6	38,3	117	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	12-ago 16:32	Corral	embarcado L2	147	39°35'17" - 73°19'17"		S. Común	11,0	9,5 - 15,5	12,0	22,6	0,0	7,5	96,2	72	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	12-ago 16:32	Corral	embarcado L2	147	39°35'17" - 73°19'17"		Anchoveta	39,0	9,5 - 16,0	11,5	61,8	-	3,0	28,6	137	1.000

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.

VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín Nº 13 : semana 33 (10 al 16 de agosto 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 13 : semana 33 (10 al 16 de agosto 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 12 : semana 32 (03 al 09 de agosto 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda biológica reproductiva.
	Ñuble (Itata)													PINV. 1 viaje sin lances. Ausencia del recurso.Se recorre la zona sin resultados. Malas condiciones climáticas en la zona.
	Biobío (B. Concepción)	36°37'18" - 72°58'54" 36°39'18" - 73°03'00"	Faro Chico I. Quiriquina	S. Común 10,6% Anchoqueta 81,7% Mote 5,5% Pejerrey 2,1% Otras sp. 0,1%	S. COMÚN	8,0	1	8,0	340	10,0 - 17,5	11,0	24,1	0,0	PINV. 1 viaje (3 lances). Recursos escaso. Otras sp.: agujilla de mar común y jaiba paco.
					ANCHOVETA	61,4		61,4	315	9,0 - 19,0	12,0	23,0		
	Biobío (G. de Arauco)	36°49'42" - 73°10'18" 37°03'42" - 73°28'54"	Boca Sur I. Sta. María	S. Común 54,0% Anchoqueta 0,2% Pejerrey 41,1% Lenguado ocelado 3,2% Otras sp. 1,5%	S. COMÚN	13,5	1	13,5	99	9,0 - 17,0	16,0	15,2	0,0	PINV. 1 viaje (2 lances, 1 con pesca). Recurso anchoqueta escaso. Otras sp.: corvina, bagre del norte.
	Total Ñuble-Biobío	36°37'18" - 72°58'54" 37°03'42" - 73°28'54"	Faro Chico I. Sta. María	S. Común 21,4% Anchoqueta 61,6% Pejerrey 11,7% Mote 4,1%	S. COMÚN	21,5	2	10,7	439	9,0 - 17,5	16,0	18,5	0,0	PINV. 3 viajes, 5 lances (4 con pesca) Recurso escaso en toda la macrozona. Se registra un viaje sin pesca (sin lances).
					ANCHOVETA	61,4		61,4	315	9,0 - 19,0	12,0	23,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°20'08" - 73°17'10"	Cayulfu	S. Común 6,7% Anchoqueta 13,3% Mote 40,0% Pampanito 26,7% Leng. De ojo chico 13,3%	S. COMÚN	21,0	1	21,0	185	7,5 - 13,0	11,5	52,4	5,9	PINV 1 viaje (1 lance). Malas condiciones climáticas dificultan maniobra de lance. Fuerte oleaje y viento en la zona. Se logra realizar un lance efectivo.
					ANCHOVETA	4,0		4,0	73	8,5 - 16,5	11,0	43,8		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°24'08" - 73°18'36" 39°37'10" - 73°21'02"	Pta. Ronca Piedra Blanca	S. Común 89,29% Anchoqueta 7,14% Pampanito 3,6%	S. COMÚN	90,0	1	90,0	227	9,5 - 15,0	11,5	17,0	0,0	PINV. 1 viaje (3 lances, 2 con pesca) Fondo rocoso impide concretar lance 2
					ANCHOVETA	7,0		7,0	105	8,0 - 16,5	14,0	42,2		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 12 : semana 32 (03 al 09 de agosto 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)						Se realiza viaje sin ejecutar lances, por ausencia del recurso. Malas condiciones climáticas en la zona
	Biobío (B. Concepción)	166	8,2	Inactivas: 1,2% III : 97,0% IV: 1,8% V: -	98,8%	259	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	65	9,9	Inactivas: - III : 100% IV: - V: -	100%	91	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	231 ^(*)	8,9	Inactivas: 0,9% III : 97,8% IV: 1,3% V: -	99,1%	350	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	51	3,8	Inactivas: 47,1% III : 51,0% IV: - V: 2,0%	51,0%	97	Actividad reproductiva alta.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	83	4,7	Inactivas: 33,7% III : 63,9% IV: - V: 2,4%	63,9%	160	Actividad reproductiva alta.
Anchoveta	Ñuble (Itata)						Se realiza viaje sin ejecutar lances, por ausencia del recurso. Malas condiciones climáticas en la zona
	Biobío (B. Concepción)	154	5,6	Inactivas: 10,4% III : 81,2% IV: 8,4% V: -	89,6%	270	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)						Recurso escaso, predomina la especie sardina común.
	Total Ñuble - Biobío	154 ^(*)	5,6	Inactivas: 10,4% III : 81,2% IV: 8,4% V: -	89,6%	270	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	37 ^(*)	2,7	Inactivas: 59,5% III : 40,5% IV: - V: -	40,5%	73	Actividad reproductiva baja
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	87	2,7	Inactivas: 62,1% III : 36,8% IV: - V: 1,1%	36,8%	114	Actividad reproductiva baja

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 12 : semana 32 (03 al 09 de agosto 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 12 : semana 32 (03 al 09 de agosto 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	08-ago 12:00	Coliumo	-	-	- -	Nuble (Itata)	S. Común	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-ago 17:30	Talcahuano	embarcado L1	131	36°37'18" - 72°58'54"	Biobío (B. Concepción)	S. Común	2,0	10,0 - 17,0	11,5	23,5	0,0	8,3	100,0	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-ago 17:30	Talcahuano	embarcado L1	131	36°37'18" - 72°58'54"		Anchoqueta	21,5	9,5 - 18,5	13,0	29,3	-	6,4	100,0	44	1.000
L/M Capello	733	17,1	08-ago 17:30	Talcahuano	embarcado L2	132	36°39'18" - 73°00'42"		S. Común	3,0	10,5 - 17,5	14,0	10,9	0,0	8,5	100,0	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-ago 17:30	Talcahuano	embarcado L2	132	36°39'18" - 73°00'42"		Anchoqueta	22,0	10,5 - 19,0	12,5	5,6	-	5,7	93,8	58	900
L/M Capello	733	17,1	08-ago 17:30	Talcahuano	embarcado L3	133	36°39'18" - 73°03'00"		S. Común	3,0	10,0 - 17,0	11,0	37,8	0,0	7,5	95,5	65	831
L/M Capello	733	17,1	08-ago 17:30	Talcahuano	embarcado L3	133	36°39'18" - 73°03'00"		Anchoqueta	18,0	9,0 - 17,0	11,5	36,7	-	4,3	78,3	80	842
L/M Capello	733	17,1	09-ago 20:00	San Vicente	embarcado L1	134	36°49'42" - 73°10'18"	Biobío (G. de Arauco)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	09-ago 20:00	San Vicente	embarcado L2	135	37°03'42" - 73°28'54"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	13,5	9,0 - 17,0	16,0	15,2	0,0	9,9	100,0	30	900
L/M Juan M S	3598	17,9	06-ago 17:08	Corral	embarcado L1	136	39°20'08" - 73°17'10"		S. Común	21,0	7,5 - 13,0	11,5	5,9	52,4	3,8	51,0	98	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	06-ago 17:08	Corral	embarcado L1	136	39°20'08" - 73°17'10"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	Anchoqueta	4,0	8,5 - 16,5	11,0	43,8	-	2,7	40,5	-	-
L/M Juan M S	3598	17,9	05-ago 20:26	Mehuín	embarcado L1	137	39°37'10" - 73°21'02"		S. Común	46,0	9,5 - 12,5	11,0	65,4	0,0	4,2	46,8	97	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	05-ago 20:26	Mehuín	embarcado L1	137	39°37'10" - 73°21'02"		Anchoqueta	4,0	8,0 - 16,5	13,0	65,5	-	2,1	16,7	-	-
L/M Juan M S	3598	17,9	05-ago 20:26	Mehuín	embarcado L2	138	39°34'25" - 73°19'15"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Juan M S	3598	17,9	05-ago 20:26	Mehuín	embarcado L3	139	39°24'08" - 73°18'36"		S. Común	44,0	10,5 - 15,0	11,5	26,8	0,0	5,2	86,1	93	1.000
L/M Juan M S	3598	17,9	05-ago 20:26	Mehuín	embarcado L3	139	39°24'08" - 73°18'36"		Anchoqueta	3,0	11,0 - 15,5	14,0	11,1	-	3,2	55,6	-	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 12 : semana 32 (03 al 09 de agosto 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 12 : semana 32 (03 al 09 de agosto 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)