



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 48

(XV, I, II REGIONES)

(21 al 27 noviembre 2016)

Convenio de Desempeño 2016

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Diciembre 2016

REQUIRENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Economía y EMT

Natalia Piergentili Domenech

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Leonardo Núñez Montaner

Jefe División Investigación Pesquera

Mauricio Galvez Larach

JEFA PROYECTO

M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento microscópico de la evolución semanal de la actividad de desove de este recurso, monitoreo que se realiza a través del análisis de indicadores histológicos de muestras de ovarios de ejemplares provenientes de diferentes zonas de pesca. En la semana 23 (30 mayo al 5 junio, 2016) se da inicio al monitoreo reproductivo intensivo de la anchoveta entre la XV y II Región.

En la Semana 48, el análisis se sustentó en 270 hembras que fueron recolectadas en la Zona de Arica, con tres (3) muestreos restringidos a 5 millas frente al puerto de Arica, y en la Zona de Antofagasta, con tres (3) muestreos a: 8 millas frente a Antofagasta y 5 millas de Punta Coloso. Los tamaños de las hembras analizadas fluctuaron en la Zona de Arica entre 11,5 y 13,5 cm (moda 12,5 cm, 3% < 12,0 cm) y en la Zona de Antofagasta entre 11,0 y 14,5 cm (moda 13,0 cm, 5% < 12,0 cm).

Incidencia de fases ováricas histológicas

El análisis de las fases de madurez mostró una mayor frecuencia de ovarios en desarrollo avanzado, en vitelación tardía (EMS 4), mientras que las hembras en desove presentaron un aporte relativamente bajo (EMS 8). Una hembra evidenció el término del evento reproductivo (EMS 9) (**Tabla 1**). Los resultados mostraron prácticamente la totalidad de las hembras en condición reproductiva (un ovario con atresia), las que evidenciaron una menor actividad de desove.

Tabla 1

Incidencia de fases microscópicas de madurez de ovarios de anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 48.

	Fases ováricas microscópicas									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
n	0	0	1	199	11	0	0	58	1	270
%	0,0	0,0	0,4	73,7	4,1	0,0	0,0	21,5	0,4	

1: Virginal; 2: Regeneración; 3: Vitelación inicial; 4: Vitelación tardía; 5: Próxima hidratación; 6: Hidratadas; 7: En desove; 8: Postdesove de tanda; 9: Regresión.

Hembras sexualmente activas (fases agrupadas 3 al 8)

Los resultados indicaron 99% de hembras sexualmente activas (1 ovario en fase 4 con atresia masiva), de las cuales, 78% evidenció estados de desarrollo gonadal y 22% en desove (**Tabla 2**). La incidencia de actividad ovárica está acorde al nivel histórico que señala sobre 90% de hembras sexualmente activas entre junio y enero – febrero (**Figura 1**).



Tabla 2
Análisis histológico de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 48.

Semana (N°)	Fecha 2016	Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta					Número	
		Hidratadas	FPO día 0	FPO día 1	FPO día 2	Desarrollo	Activas	Total
23	30/05 - 05/06	0,0	0,0	3,4	2,2	94,4	179	205
24	06/06 - 12/06	7,6	0,7	2,1	4,1	85,5	145	149
25	13/06 - 19/06	0,0	0,0	4,3	2,1	93,6	280	292
26	20/06 - 26/06	4,4	0,0	7,7	5,1	82,8	274	299
27	27/06 - 03/07	0,0	0,0	0,7	1,4	98,0	294	295
28	04/07 - 10/07	0,0	0,0	24,2	7,9	67,9	302	305
29	11/07 - 17/07	3,6	0,0	22,8	14,6	58,9	302	304
30	18/07 - 24/07	4,7	0,0	18,3	1,3	75,5	317	317
31	25/07 - 31/07	1,3	0,0	28,4	4,3	65,9	299	304
32	01/08 - 07/08	0,0	0,0	33,7	3,3	63,0	300	302
33	08/08 - 14/08							
34	15/08 - 21/08							
35	22/08 - 28/08	4,7	0,0	31,8	2,3	61,2	299	303
36	29/08 - 04/09	4,2	0,0	5,7	0,4	89,8	264	301
37	05/09 - 11/09	24,6	0,0	22,6	10,8	42,0	305	310
38	12/09 - 18/09	19,3	0,0	29,7	9,8	41,2	306	306
39	19/09 - 25/09	13,1	0,0	37,6	8,1	41,3	298	302
40	26/09 - 02/10	4,5	0,0	36,6	7,9	51,0	292	297
41	03/10 - 09/10	0,0	0,0	3,0	1,5	95,5	132	147
42	10/10 - 16/10	0,7	0,0	32,9	5,6	60,8	143	144
43	17/10 - 23/10	1,7	0,0	10,4	3,3	84,6	241	298
44	24/10 - 30/10	2,5	0,0	11,8	6,4	79,3	280	308
45	31/10 - 06/11	0,0	0,0	26,7	13,2	60,1	273	276
46	07/11 - 13/11	0,0	0,0	25,3	17,9	56,8	95	101
47	14/11 - 20/11	0,0	0,0	14,5	3,2	82,3	62	63
48	21/11 - 27/11	0,0	0,0	13,4	8,2	78,4	268	270




Figura 1 Incidencia semanal de hembras sexualmente activas (fases 3 al 8), años 2015 – 2016 y serie histórica 2001 – 2014.



Índice de actividad de desove (IAD) y de atresia ovárica (IAO)

De acuerdo al análisis en la Zona de Arica y Antofagasta, el índice de actividad de desove (IAD) en la semana 48 fue **13%**, con **0,4%** de atresia ovocitaria (**Tabla 3**). Según los resultados, se evidenció una relativa baja intensidad de desove (**Figura 2**).




Figura 2 Evolución semanal del índice de actividad de desove (IAD) y de atresia ovárica (IAO), años 2015 – 2016 y serie histórica del IAD años 1999 – 2014.
(La línea segmentada representa el umbral de IAD 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).

Índice gonadosomático (IGS)

Según el índice gonadosomático (IGS), la anchoveta se mantiene con actividad ovárica, con una tendencia al descenso paulatino respecto a los registros del bimestre septiembre-octubre, resultado concordante con el nivel de hembras sexualmente activas a nivel histológico (**Tabla 3** y **Figura 3**).



Tabla 3
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta, semana 48.

Semana (N°)	Fecha 2016	Macroscópico		Microscópico		
		IGS	n	IAD	IAO	n
23	30/05 - 05/06	5,5	35	2,9	4,4	205
24	06/06 - 12/06	5,6	17	10,1	0,7	149
25	13/06 - 19/06	5,7	634	4,1	2,7	292
26	20/06 - 26/06	5,1	387	11,0	7,4	299
27	27/06 - 03/07	6,3	445	0,7	0,3	295
28	04/07 - 10/07	5,8	607	23,9	1,0	305
29	11/07 - 17/07	6,3	550	26,3	0,7	304
30	18/07 - 24/07	6,4	794	23,0	0,0	317
31	25/07 - 31/07	6,5	468	29,3	1,6	304
32	01/08 - 07/08	7,2	539	33,4	0,7	302
33	08/08 - 14/08					
34	15/08 - 21/08					
35	22/08 - 28/08	7,1	423	36,0	1,3	303
36	29/08 - 04/09	5,9	310	8,6	12,3	301
37	05/09 - 11/09	6,6	276	46,5	1,6	310
38	12/09 - 18/09	7,0	299	49,0	0,0	306
39 (**)	19/09 - 25/09	7,6	426	50,0	1,3	302
40	26/09 - 02/10	5,8	214	40,4	1,3	297
41	03/10 - 09/10	6,0	110	2,7	10,2	147
42	10/10 - 16/10	6,2	166	33,3	0,7	144
43	17/10 - 23/10	5,9	408	9,7	15,4	298
44	24/10 - 30/10	5,6	547	13,0	8,8	308
45	31/10 - 06/11	7,0	313	26,4	1,1	276
46	07/11 - 13/11	5,6	140	23,8	4,0	101
47	14/11 - 20/11	5,1	53	14,3	1,6	63
48	21/11 - 27/11	6,0	337	13,3	0,4	270

**** Valor extraordinario días 22 y 23/9 levantada la veda = valor IAD = 46%; valor IAO = 0%; n = 67**



Figura 3 Evoluci3n semanal del 3ndice gonadosom3tico (IGS), a3os 2015 – 2016 y serie hist3rica 2000 – 2014.

(La l3nea segmentada representa el valor IGS 5% referencial del evento reproductivo).

Consideraci3n final

Seg3n los indicadores en la semana 48, la anchoveta en el 3rea de Arica y Antofagasta se mantiene en condici3n reproductiva, la que evidenci3 una relativa baja intensidad de desove.

Desde mediados de noviembre, el IAD reflej3 la disminuci3n de la intensidad del desove respecto al repunte que manifest3 el indicador durante las dos primeras semanas de noviembre, principalmente en muestreos restringidos a la Zona de Arica, destacando que la tendencia del indicador IAD en las semanas de octubre mostr3 marcadas ca3das en la actividad de desove, hecho que se asoci3 conjuntamente al incremento de ovarios con atresia masiva y a la presencia de una fracci3n menor de hembras que presentaron la condici3n de t3rmino del evento reproductivo.

La tendencia de los indicadores en las semanas de octubre mostraron una brusca ca3da de la actividad de desove (IAD) y el incremento de atresia ov3rica (IAO), antecedentes que evidenciaron la disminuci3n de la intensidad de desove, hecho acorde al patr3n hist3rico de la anchoveta en la Zona Norte que se3ala el t3rmino del periodo de la m3xima intensidad de desove (MID) a mediados y fines de octubre.